

脳腫瘍

更新日：R3年 3月 1日(月)

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>Temozolomide（初回）：放射線併用</u>	テモゾロミド	経口	75 mg/m ²	1～42	28

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>Temozolomide（2回目以降）</u>	テモゾロミド	経口	150 mg/m ²	1～5	28

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>BV（放射線併用期）</u> * 計4回投与 その後4週間休薬	ベバシズマブ	注射	10 mg/kg	1	14

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>BV（維持期）</u>	ベバシズマブ	注射	10 mg/kg	1	14

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>BV（再発）</u>	ベバシズマブ	注射	10 mg/kg	1	14

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>BV（3週間隔）</u>	ベバシズマブ	注射	15 mg/kg	1	21

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>Temozolomide（維持・再発）</u>	テモゾロミド	経口	150/200 mg/m ²	1～5	28

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>ACNU</u>	ニムスチン（ニドラン）	注射	2 mg/kg	1	28