

## 膵がん

更新日：R4年04月08日(金)

| 癌腫  | レジメン                          | 投与薬剤                                         | 投与経路 | 投与量                    | 投与日    | 1コース期間(日) |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------|--------|-----------|
| 膵がん | nab-PTX+GEM                   | nab-PTX<br>(アルブミン懸濁型パクリタキセル)<br>GEM (ゲムシタビン) | 点滴   | 125 mg/m <sup>2</sup>  | 1,8,15 | 28        |
|     |                               |                                              | 点滴   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 1,8,15 |           |
| 癌腫  | レジメン                          | 投与薬剤                                         | 投与経路 | 投与量                    | 投与日    | 1コース期間(日) |
| 膵がん | GEM                           | GEM (ゲムシタビン)                                 | 点滴   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 1,8,15 | 28        |
| 癌腫  | レジメン                          | 投与薬剤                                         | 投与経路 | 投与量                    | 投与日    | 1コース期間(日) |
| 膵がん | TS-1+GEM                      | TS-1(S-1)<br>GEM (ゲムシタビン)                    | 経口   | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 1～14   | 21        |
|     |                               |                                              | 点滴   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 1,8    |           |
| 癌腫  | レジメン                          | 投与薬剤                                         | 投与経路 | 投与量                    | 投与日    | 1コース期間(日) |
| 膵がん | Erlotinib+GEM                 | エルロチニブ<br>GEM (ゲムシタビン)                       | 経口   | 100 mg/Body            | 1～28   | 28        |
|     |                               |                                              | 点滴   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 1,8,15 |           |
| 癌腫  | レジメン                          | 投与薬剤                                         | 投与経路 | 投与量                    | 投与日    | 1コース期間(日) |
| 膵がん | FOLFIRINOX                    | L-OHP (オキサリプラチン)                             | 点滴   | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 1      | 14        |
|     |                               | CPT-11 (イリノテカン)                              | 点滴   | 180 mg/m <sup>2</sup>  | 1      |           |
|     |                               | I-LV (レボホリナート)                               | 点滴   | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 1      |           |
|     |                               | 5FU(フルオロウラシル)                                | 点滴   | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 1      |           |
|     |                               | 5FU(フルオロウラシル)                                | 持続点滴 | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 46hr   |           |
| 癌腫  | レジメン                          | 投与薬剤                                         | 投与経路 | 投与量                    | 投与日    | 1コース期間(日) |
| 膵がん | TS-1                          | TS-1(S-1)                                    | 経口   | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 1～28   | 42        |
| がん腫 | レジメン                          | 投与薬剤                                         | 投与経路 | 投与量                    | 投与日    | 1コース期間(日) |
| 膵がん | Liposomal irinotecan+5FU+I-LV | nal-IRI(リボソーム型イリノテカン)                        | 点滴   | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 1      | 14        |
|     |                               | I-LV (レボホリナート)                               | 点滴   | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 1      |           |
|     |                               | 5FU(フルオロウラシル)                                | 持続点滴 | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 46hr   |           |