

皮膚癌

更新日：R2年3月2日(月)

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性黒色腫	<u>Dabrafenib+Trametinib</u>	ダブラフェニブ	経口	300 mg/body	連日	
		トラメチニブ	経口	2 mg/body	連日	

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性黒色腫	<u>Vemurafenib</u>	ベムラフェニブ	経口	1920 mg/body	連日	

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性黒色腫	<u>Nivolumab</u>	ニボルマブ	注射	240 mg/body	1	14

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性黒色腫	<u>Pembrolizumab</u>	ペンプロリズマブ	注射	200 mg/body	1	21

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性黒色腫	<u>Ipilimumab</u>	イピリムマブ	注射	3 mg/kg	1	21

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性黒色腫	<u>Nivolumab+Ipilimumab</u> (1～4コースまで)	ニボルマブ	注射	80 mg/body	1	21
		イピリムマブ	注射	3 mg/kg	1	
	5コース以降	ニボルマブ	注射	240 mg/body	1	14

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性黒色腫	<u>DAV feron</u>	DTIC(ダカルバジン)	注射	80～140 mg/body	1,2,3,4,5	28
		ACNU(ニムスチン)	注射	50～80 mg/m ²	1	
		VCR(ピンクリスチン)	注射	0.5～0.8 mg/m ²	1	
		INF-β(フェロン)	局注	300万 単位	1～5 (最大10日)	

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
上皮系皮膚	<u>Nivolumab</u>	ニボルマブ	注射	240 mg/body	1	14
悪性腫瘍	(14日間隔 or 28日間隔)	ニボルマブ	注射	480 mg/body	1	28