

精巣腫瘍(胚細胞腫瘍)

更新日：R5年11月30日

癌腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
精巣腫瘍 (胚細胞性腫瘍)	BEP療法	BLM (シスプラチン)	点滴	30 mg/body	1,8,15	21
		VP-16 (エトポシド)	点滴	100 mg/m ²	1,2,3,4,5	
		CDDP (シスプラチン)	点滴	20 mg/m ²	1,2,3,4,5	
癌腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
精巣腫瘍 (胚細胞性腫瘍)	TIP療法	PTX (パクリタキセル)	点滴	175 mg/m ²	1	21
		CDDP (シスプラチン)	点滴	20 mg/m ²	2～6	
		IFM (イホスファミド)	点滴	1200 mg/m ²	2～6	
		メスナ	点滴	1200 mg/body	2～6	
癌腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
精巣腫瘍 (胚細胞性腫瘍)	VIP療法	VP-16 (エトポシド)	点滴	75 mg/m ²	1～5	21
		CDDP (シスプラチン)	点滴	20 mg/m ²	1～5	
		IFM (イホスファミド)	点滴	1200 mg/m ²	1～5	
		メスナ	点滴	240 mg/m ²	1～5	