

大腸がん

更新日：R5年11月30日

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
大腸がん	mFOLFOX6+BV(5)	BV(ベバシズマブ)	点滴	5 mg/kg	1	14
		L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	85 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
大腸がん	mFOLFOX6+BV(10)	BV(ベバシズマブ)	点滴	10 mg/kg	1	14
		L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	85 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
大腸がん	CapeOX	Cape(カペシタビン)	経口	2000 mg/m ²	1~14	21
		L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	130 mg/m ²	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
大腸がん	CapeOX+BV(5)	BV(ベバシズマブ)	点滴	7.5 mg/kg	1	21
		Cape(カペシタビン)	経口	2000 mg/m ² /日	1~14	
		L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	130 mg/m ²	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
大腸がん	mFOLFOX6+Cmab(400)(1回分)	C-mab(セツキシマブ)	点滴	400 mg/m ²	1	14
		L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	85 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
大腸がん	mFOLFOX6+Cmab(250)(1回分)	C-mab(セツキシマブ)	点滴	250 mg/m ²	1	14
		L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	85 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
大腸がん	mFOLFOX6+Pmab	P-mab(パニツム マブ)	点滴	6 mg/kg	1	14
		L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	85 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
大腸がん	FOLFIRI	CPT-11 (イリノテカン)	点滴	180 mg/m ²	1	14
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
大腸がん	FOLFIRI+BV(5)	BV(ベバシズマブ)	点滴	5 mg/kg	1	14
		CPT-11 (イリノテカン)	点滴	180 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
大腸がん	FOLFIRI+BV(10)	BV(ベバシズマブ)	点滴	10 mg/kg	1	14
		CPT-11 (イリノテカン)	点滴	180 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
大腸がん	FOLFIRI+Cmab(400)(1回分)	C-mab(セツキシマブ)	点滴	400 mg/m ²	1	14
		CPT-11 (イリノテカン)	点滴	180 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	
大腸がん	FOLFIRI+Cmab(250)(1回分)	C-mab(セツキシマブ)	点滴	250 mg/m ²	1,8	14
		CPT-11 (イリノテカン)	点滴	180 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	
大腸がん	FOLFIRI+Pmab	P-mab(パニツム マブ)	点滴	6 mg/kg	1	14
		CPT-11 (イリノテカン)	点滴	180 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	
大腸がん	FOLFIRI+RAM	RAM(ラムシルマブ)	点滴	8 mg/kg	1	14
		CPT-11 (イリノテカン)	点滴	180 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	
大腸がん	FOLFIRI+Aflibercept	Aflibercept(アフリベルセプト)	点滴	4 mg/kg	1	14
		CPT-11 (イリノテカン)	点滴	180 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	
大腸がん	SOX (大腸)	TS-1(S-1)	経口	80 mg/m ²	1~14	21
		L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	130 mg/m ²	1	
大腸がん	SOX+BV(7.5)	BV/B-mab(ベバシズマブ)	点滴	7.5 mg/kg	1	21
		TS-1(S-1)	経口	80 mg/m ²	1~14	
		L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	130 mg/m ²	1	
大腸がん	IRIS	TS-1(S-1)	経口	80 mg/m ²	1~14	28
		CPT-11 (イリノテカン)	点滴	125 mg/m ²	1,15	
大腸がん	Cmab(400)	Cmab(セツキシマブ)	点滴	400 mg/m ²	1	14
大腸がん	Cmab(250)	Cmab(セツキシマブ)	点滴	250 mg/m ²	1,8	14
大腸がん	Pmab	Pmab(パニツム マブ)	点滴	6 mg/kg	1	14
大腸がん	Regorafenib	レゴラフェニブ	経口	160 mg/Body	1~21	28
大腸がん	UFT/ユーゼル	UFT	経口	300 mg/m ²	1~28	35
		ユーゼル	経口	75 mg/day	1~28	
大腸がん	カベシタピン	カベシタピン	経口	2500 mg/m ²	1~14	21
大腸がん	ロザ-7	TAS-102(ロザ-7)	経口	70 mg/m ²	1~5,8~12	28
結腸がん・直腸がん	TS-1	TS-1	経口	80 mg/m ²	1~28	42

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
大腸がん (小腸がん)	mFOLFOX6	L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	85 mg/m ²	1	14
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	
大腸がん	5FU/I-LV	5FU(フルオロウラシル)	点滴	600 mg/m ²	1,8,15,22,29,36	56
	I-LV(レボホリナート)	点滴	250 mg/m ²	1,8,15,22,29,36		
大腸がん	sLV5FU2	5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1,8,15,22,29,36	14
	5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr		
	I-LV(レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1,8,15,22,29,36		
大腸がん	sLV5FU2+BV (B-mab) (5)	5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1,8,15,22,29,36	14
	5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr		
	I-LV(レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1,8,15,22,29,36		
	BV (ベバシズマブ)	点滴	5 mg/kg	1		
大腸がん	sLV5FU2+BV (B-mab) (10)	5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1,8,15,22,29,36	14
	5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr		
	I-LV(レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1,8,15,22,29,36		
	BV (ベバシズマブ)	点滴	10 mg/kg	1		
大腸がん	CAPIRI±BV	±BV(ベバシズマブ)	点滴	7.5 mg/kg	1	14
		CPT-11 (イリノテカン)	点滴	150~180 mg/m ²	1	
		Cape (カベシタピン)	内服	1600 mg/m ²	1~14	
大腸がん	FOLFOXIRI±BV	BV(ベバシズマブ)	点滴	5 mg/kg	1	14
		L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	85 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	
大腸がん	化学放射線療法 (5FU)	5FU(フルオロウラシル)	点滴	350 mg/m ²	1-5、29-33	
大腸がん	Encorafenib+Binimetinib+Cmab(1回目)	C-mab(セツキシマブ)	点滴	400 mg/m ²	1	7
		Encorafenib(エンコラフェニブ)	内服	300 mg/body	連日内服	
		Binimetinib (ビニメチニブ)	内服	90 mg/body	連日内服	
大腸がん	Encorafenib+Binimetinib+Cmab(2回目~)	C-mab(セツキシマブ)	点滴	250 mg/m ²	1	7
		Encorafenib(エンコラフェニブ)	内服	300 mg/body	連日内服	
		Binimetinib (ビニメチニブ)	内服	90 mg/body	連日内服	
大腸がん	Nivolumab+Ipilimumab 1st~4 (4~5まで) *4~5終了後は以下のニボルマブ2週間隔もしくは4週間隔投与のいずれかに移行する	Nivolumab(ニボルマブ)	点滴	240 mg/body	1	21
		Ipilimumab(イピリムマブ)	点滴	1 mg/kg	1	
		Nivolumab (2週間隔) 5~	Nivolumab(ニボルマブ)	点滴	240 mg/Body	1
Nivolumab (4週間隔) 5~	Nivolumab(ニボルマブ)	点滴	480 mg/Body	1	28	
大腸がん	Encorafenib+Cmab(1回目)	C-mab(セツキシマブ)	点滴	400 mg/m ²	1	7
		Encorafenib(エンコラフェニブ)	内服	300 mg/body	連日内服	
大腸がん	Encorafenib+Cmab(2回目~)	C-mab(セツキシマブ)	点滴	250 mg/m ²	1	7
		Encorafenib(エンコラフェニブ)	内服	300 mg/body	連日内服	