

白血病

更新日：R4年09月30日

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	JALSG-AML201 寛解導入療法A群	イダルビシン(IDA)	点滴	12 mg/m ²	1,2,3	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	100 mg/m ²	1~7	
白血病	JALSG-AML201 寛解導入療法B群	ダウノルビシン(DNR)	点滴	50 mg/m ²	1~5	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	100 mg/m ²	1~7	
白血病	JALSG-AML201寛解後療法C群	シタラビン(Ara-C)	点滴	2000 mg/m ² /回	1-5 (1日2回 12時間毎)	
白血病	JALSG-AML201 寛解後療法D群D-1(MA)	ミトキサントロン (MIT)	点滴	7 mg/m ²	1,2,3	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	200 mg/m ²	1~5	
白血病	JALSG-AML201 寛解後療法D群D-2(DA)	ダウノルビシン(DNR)	点滴	50 mg/m ²	1,2,3	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	200 mg/m ²	1~5	
白血病	JALSG-AML201 寛解後療法D群D-3(AA)	アクリルビシン(ACR)	点滴	20 mg/m ²	1~5	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	200 mg/m ²	1~5	
白血病	JALSG-AML201 寛解後療法D群D-4(A-VVV)	シタラビン(Ara-C)	点滴	200 mg/m ²	1~5	
		エトポシド(VP-16)	点滴	100 mg/m ²	1~5	
		ビンクリスチン(VCR)	点滴	0.8 mg/m ²	8	
		ビンデシン(VDS)	点滴	2 mg/m ²	10	
白血病	ヒ素	三酸化ヒ素(ATO)	点滴	0.15 mg/Kg	1~60	
白血病	JALSG-APL204 寛解導入療法A群	トレチノイン(ATRA)	内服	45 mg/m ²	1~	
白血病	JALSG-APL204 寛解導入療法B群	トレチノイン(ATRA)	内服	45 mg/m ²	1~	
		イダルビシン(IDA)	点滴	12 mg/m ²	1,2	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	100 mg/m ²	1~5	
白血病	JALSG-APL204 寛解導入療法C群	トレチノイン(ATRA)	内服	45 mg/m ²	1~	
		イダルビシン(IDA)	点滴	12 mg/m ²	1,2,3	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	100 mg/m ²	1~7	
白血病	JALSG-APL204 寛解導入療法D群	イダルビシン(IDA)	点滴	12 mg/m ²	1 or 1,2,3	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	100 mg/m ²	1,2 or 1~7	
白血病	ALSG-APL204 地固め第1コース(C1)	ミトキサントロン(MITO)	点滴	7 mg/m ²	1,2,3	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	200 mg/m ²	1~5	
白血病	ALSG-APL204 地固め第2コース(C2)	ダウノルビシン(DNR)	点滴	50 mg/m ²	1,2,3	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	200 mg/m ²	1~5	
白血病	ALSG-APL204 地固め第3コース(C3)	イダルビシン(IDA)	点滴	12 mg/m ²	1,2,3	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	140 mg/m ²	1~5	
白血病	JALSG-APL204 維持Am80群	タミバロテン(Am80)	内服	6 mg/m ²	1~14	84
白血病	JALSG-APL204 維持ATRA群	トレチノイン(ATRA)	内服	45 mg/m ²	1~14	84

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	JALSG Ph+ALL202 寛解導入療法	イマチニブ	内服	600 mg/Body	8~63	
		シクロホスファミド(CPA)	点滴	1200 mg/m ²	1	
		ダウノルビン(DNR)	点滴	60 mg/m ²	1,2,3	
		ビンクリスチン(VCR)	点滴	1.3 mg/m ²	1,8,15,22	
		プレドニゾン(PSL)	内服	60 mg/m ²	1~21	
		メソトレキサート(MTX)+シタラビン(Ara-C)+デキサメタゾン(DEX)	髄注	15+40+4 mg/Body	29	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	CA療法	シタラビン(Ara-C)	点滴	10 mg/m ² /回	1~14 1日2回	
		アクリルビン(ACR)	点滴	14 mg/m ²	1~4	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	HDAC(CALGB)	シタラビン(Ara-C)	点滴	3000 mg/m ² /回	1,3,5 1日2回 12時 間毎	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	IDA+シタラビン(Ara-C)(2+5)	イダルビン(IDA)	点滴	12 mg/m ²	1,2	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	100 mg/m ²	1~5	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	IDA+シタラビン(Ara-C)(3+7)	イダルビン(IDA)	点滴	12 mg/m ²	1,2,3	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	100 mg/m ²	1~7	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	ゲムツズマブオゾガマイシン	ゲムツズマブオゾガマイシン(GO)	点滴	9 mg/m ²	1	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	グリベック	グリベック	内服	400-800 mg/Body	連日	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	ハイドレア	ハイドレア	内服	500-2000 mg/Body	連日	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	Ponatinib療法	ポナチニブ	内服	45 mg/Body	連日	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	フルダラビン単独点滴	フルダラビン	内服	20 mg/m ²	1-5	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	Ibrutinib療法	イブルチニブ	内服	420 mg/Body	連日	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	MEC-1	ミトキサントロン(MITO)	点滴	8 mg/m ²	1,2,3	
		エトポシド(VP-16)	点滴	100 mg/m ²	1~5	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	100 mg/m ²	1~7	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	JALSG ALL202-O	シクロホスファミド(CPA)	点滴	1200 mg/m ²	1	
		ダウノルビン(DNR)	点滴	60 mg/m ²	1,2,3	
		ビンクリスチン(VCR)	点滴	1.3 mg/m ²	1,8,15,22	
		L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	点滴	3000 U/m ²	9,11,13 16,18,20	
		プレドニゾン(PSL)	内服	60 mg/m ²	1~21	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	JALSG ALL202-O(C1)	シタラビン(Ara-C)	点滴	2000 mg/m ² /回	1,2,3(12時間毎 (1日2回))	
		エトポシド(VP-16)	点滴	100 mg/m ²	1,2,3	
		デキサメタゾン(DEX)	点滴	40 mg/Body	1,2,3	
		メソトレキサート(MTX)+デキサメタゾン(DEX)	髄注	15+4 mg/Body	1	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	ALL(Ph+)地固め療法C1 (60-64歳)	メソトレキサート(MTX)	点滴	1000 mg/m ²	1	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	1000 mg/m ² /回	2,3(1日2回12hr 毎)	
		メチルプレドニゾン(mPSL)	点滴	50 mg/Body	1,2,3	
		イマチニブ	内服	600 mg/Body	4~21	
		ロイコポリン	点滴	15 mg/Body	2,3,4	
		メソトレキサート(MTX)+シタラビン(Ara-C)+デキサメタゾン(DEX)	髄注	15+40+4 mg/Body	1	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	AJALSG Ph+ALL208 IMA地固め療法C2 (15-64歳)	シクロホスファミド(CPA)	点滴	1200 mg/m ²	1	
		ダウノルビシン(DNR)	点滴	60 mg/m ²	1	
		ビンクリスチン(VCR)	点滴	1.3 mg/m ²	1	
		メチルプレドニゾン(mPSL)	点滴	60 mg/m ²	1~7	
		イマチニブ	内服	600 mg/Body	2~21	
		メソトレキサート(MTX)+シタラビン(Ara-C)+デキサメタゾン(DEX)	髄注	15+40+4 mg/Body	1	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	MEC	ミトキサントロン(MITO)	点滴	6 mg/m ²	1,2,3	
		エトポシド(VP-16)	点滴	80 mg/m ²	1~7	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	100 mg/m ²	1~7	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	JALSG APL212 C4	ゲムツズマブオゾガマイシン(GO)	点滴	4 mg/m ²	1,15	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	JALSG Ph(-)B-ALL213 寛解導入療法	ブレドニゾン(PSL)	{滴または内}	60 mg/m ²	1~7	
		ビンクリスチン(VCR)	点滴	1.3 mg/m ²	8,15,22, 29	
		ダウノルビシン(DNR)	点滴	45 mg/m ²	8,9,10	
		シクロホスファミド(CPA)	点滴	1200 mg/m ²	8	
		L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	点滴	5000 UI/m ²	15,17,19,21,23, 25,27,29	
		ブレドニゾン(PSL)	内服	60 mg/m ²	8~28	
		メソトレキサート(MTX)+シタラビン(Ara-C)+デキサメタゾン(DEX)	髄注	15+40+4 mg/Body	8,15	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法C1: HDシタラビン(Ara-C) phase)	シタラビン(Ara-C)	点滴	4000 mg/m ²	1,2 1日2回 12 時間毎	
		エトポシド(VP-16)	点滴	100 mg/m ²	1,2,3	
		デキサメタゾン(DEX)	点滴	40 mg/m ²	1,2,3	
		L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	点滴	10000 UI/m ²	4	
		メソトレキサート(MTX)+シタラビン(Ara-C)+デキサメタゾン(DEX)	髄注	15+40+4 mg/Body	1	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法C2:HDメソトレキサート(MTX) phase	メソトレキサート(MTX)	点滴	3000 mg/m ²	1,15	
		ビンクリスチン(VCR)	点滴	1.3 mg/m ²	1,15	
		メルカプトプリン(6-MP)	内服	25 mg/m ²	1~21	
		L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	点滴	10000 UI/m ²	3,17	
		メソトレキサート(MTX)+シタラビン(Ara-C)+デキサメタゾン(DEX)	髄注	15+40+4 mg/Body	1,15	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法C3: Intensive phase	ビンクリスチン(VCR)	点滴	1.3 mg/m ²	1,8,15	
		ダウノルビシン(DNR)	点滴	45 mg/m ²	1,8,15	
		デキサメタゾン(DEX)	内服	10 mg/m ²	1~8, 15~22	
		シクロホスファミド(CPA)	点滴	1200 mg/m ²	29	
		メルカプトプリン(6-MP)	内服	25 mg/m ²	29~42	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	75 mg/m ²	29~33 36~40	
		L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	点滴	5000 UI/m ²	2,4,6, 9,11,13	
		メソトレキサート(MTX)+シタラビン(Ara-C)+デキサメタゾン(DEX)	髄注	15+40+4 mg/Body	1,29	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	APL212G寛解導入A群	トレチノイン(ATRA)	内服	45 mg/m ²	連日	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	ベンダムスチン (CLL)	ベンダムスチン	点滴	100 mg/m ²	1,2	28

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	mLSG15 (VCAP-AMP-VECP)	ビンクリスチン(VCR)	点滴	1 mg/m ²	1	
		シクロホスファミド(CPA)	点滴	350 mg/m ²	1	
		アドリアマイシン(ADM)	点滴	40 mg/m ²	1	
		ブレドニゾロン(PSL)	内服	40 mg/m ²	1	
		アドリアマイシン(ADM)	点滴	30 mg/m ²	8	
		サイメリン(MCNU)	点滴	60 mg/m ²	8	
		ブレドニゾロン(PSL)	内服	40 mg/m ²	8	
		フィルデシン(VDS)	点滴	2.4 mg/m ²	15	
		エトポシド(VP-16)	点滴	100 mg/m ²	15,16,17	
		カルボプラチン(CBDCA)	点滴	250 mg/m ²	15	
		ブレドニゾロン(PSL)	内服	40 mg/m ²	15,16,17	
		メトトレキサート(MTX)+シタラビン(Ara-C)+ブレドニゾロン(PSL)	髄注	15+40+10 mg/Body		

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
成人T細胞白血病 リンパ腫	モガムリズマブ	モガムリズマブ (ポテリジオ)	点滴	1 mg/kg	1	7日以上

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
急性リンパ性白血病 ALL	小児ALL維持療法SR、IR	メトトレキサート(MTX)	経口	20 mg/m ²	1	7
		ロイケリン(6-MP)	経口	50 mg/m ²	1~7 連日	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
急性骨髄性白血病	JALSG-RR-FLT3-AML220	ミトキサントロン	点滴	8 mg/m ²	1~3	28
		エトポシド	点滴	100 mg/m ²	1~5	
		シタラビン	持続静注	100 mg/m ²	1~7	
		ギルテリチニブ (ゾスバタ)	内服	120 mg/body	8~28	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	AML	ベネトクラクス(ベネクレクスタ)	経口	400 mg/body	1~28	28
		アザシチジン(AZA: ビダーザ)	皮下/静注	75 mg/m ²	1~7	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
白血病	AML	ベネトクラクス(ベネクレクスタ)	経口	600 mg/body	1~28	28
		シタラビン(Ara-C: キロサイド)	皮下	20 mg/m ²	1~10	