

末梢血幹細胞採取移植

更新日: R2年 月 日 0

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース当たりの期間
多発性骨髄腫・リンパ腫	悪性リンパ腫PBSCH VP-16大量	エトポシド(VP-16)	点滴	500 mg/m <sup>2</sup>	1,2,3	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース当たりの期間
リンパ腫	悪性リンパ腫PBSCT MCEC	ラニムスチン(MCNU)	点滴	200 mg/m <sup>2</sup>	-8,-3	
		カルボプラチン(CBDCA)	点滴	300 mg/m <sup>2</sup>	-7, -6, -5, -4	
		エトポシド(VP-16)	点滴	500 mg/m <sup>2</sup>	-6, -5, -4	
		シクロフォスファミド(CPA)	点滴	50 mg/kg	-3, -2	
		自己末梢血幹細胞移植			0	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース当たりの期間
多発性骨髄腫	末梢血幹細胞採取大量エンドキサ ン療法	シクロフォスファミド(CPA)	点滴	### mg/m <sup>2</sup>	1,2	
		ウロミテキサン	点滴	800 mg/m <sup>2</sup>	1,2 エンドキサン終了直後	
		ウロミテキサン	点滴	800 mg/m <sup>2</sup>	1,2 エンドキサン終了4時間後	
		ウロミテキサン	点滴	800 mg/m <sup>2</sup>	1,2 エンドキサン終了8時間後	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース当たりの期間
多発性骨髄腫	骨髄腫auto-PBSCT メルファラン大量	メルファラン(L-PAM)	点滴	200 mg/m <sup>2</sup>	-2	
		自己末梢血幹細胞移植			0	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース当たりの期間
リンパ腫	悪性リンパ腫PBSCT MCEC	ラニムスチン(MCNU)	点滴	300 mg/m <sup>2</sup>	-6	
		エトポシド(VP-16)	点滴	100 mg/m <sup>2</sup> /回	-5~-2(12時間毎に8回)	
		シタラビン(Ara-C)	点滴	200 mg/m <sup>2</sup> /回	-5~-2(12時間毎に8回)	
		メルファラン(L-PAM)	点滴	140 mg/m <sup>2</sup>	-1	
		自己末梢血幹細胞移植			0	