

脳腫瘍

更新日：R3年 3月 1日(月)

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>Temozolomide (初回) : 放射線併用</u>	テモゾロミド	経口	75 mg/m ²	1~42	28

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>Temozolomide (2回目以降)</u>	テモゾロミド	経口	150 mg/m ²	1~5	28

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>BV (放射線併用期)</u> * 計4回投与 その後4週間休薬	ベバシズマブ	注射	10 mg/kg	1	14

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>BV (維持期)</u>	ベバシズマブ	注射	10 mg/kg	1	14

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>BV (再発)</u>	ベバシズマブ	注射	10 mg/kg	1	14

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>BV (3週間隔)</u>	ベバシズマブ	注射	15 mg/kg	1	21

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>Temozolomide (維持・再発)</u>	テモゾロミド	経口	150/200 mg/m ²	1~5	28

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
悪性神経膠腫	<u>ACNU</u>	ニムスチン (ニドラン)	注射	2 mg/kg	1	28