

膵がん

更新日：R4年04月08日(金)

癌種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
膵がん	nab-PTX+GEM	nab-PTX (アルブミン懸濁型パクリタキセル)	点滴	125 mg/m ²	1,8,15	28
		GEM (ゲムシタビン)	点滴	1000 mg/m ²	1,8,15	
膵がん	GEM	GEM (ゲムシタビン)	点滴	1000 mg/m ²	1,8,15	28
膵がん	TS-1+GEM	TS-1(S-1)	経口	60 mg/m ²	1~14	21
		GEM (ゲムシタビン)	点滴	1000 mg/m ²	1,8	
膵がん	Erlotinib+GEM	エルロチニブ	経口	100 mg/Body	1~28	28
		GEM (ゲムシタビン)	点滴	1000 mg/m ²	1,8,15	
膵がん	FOLFIRINOX	L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	85 mg/m ²	1	14
		CPT-11 (イリノテカン)	点滴	180 mg/m ²	1	
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	
膵がん	TS-1	TS-1(S-1)	経口	80 mg/m ²	1~28	42
膵がん	Liposomal irinotecan+5FU+I-LV	nal-IRI(リボソーム型イリノテカン)	点滴	70 mg/m ²	1	14
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m ²	46hr	